

## MALATTIE TRASMESSE SESSUALMENTE

<u>MALATTIA</u>	<u>AGENTE</u>	<u>DIAGNOSI</u>	<u>LATENZA</u>	<u>TERAPIA</u>	<u>NOTE</u>
<b>SIFILIDE</b>	Treponema pallidum	Clinica VDRL, TPHA	10-90 di'	Penicillina-G 2.4 M meta' per gluteo i.m. se all.TC 500mg qid x15di'	HIV
<b>GONORREA</b>	Neisseria Gonorrhoeae	clinica culturale	1-3 di'	Penicillina-G 4.8 M meta' per gluteo i.m. TC 500mg qidX7 di'	VDRL
<b>HERPES</b>	HSV2 (90%) HSV1 (10%)	clinica	2-10 di' (prima eruzione)	Acyclovir per os	HIV
<b>CONDILOMI</b>	HPV	clinica  istologica	10-180 di'	Interferone  chirurgia	Vaccino PAP test Colposcopia
<b>CHLAMYDIA</b>	Chlamydia Trachomatis	cultura	5-21 di'	TC 500mg qidX21 di Azitromicina 400 mg X 2 di	GONORREA
<b>TRICHOMONAS</b>	Trichomonas	clinico	1-5 di'	Metronidazolo monodose per os	ODORE DI PESCE MARCIO
<b>CANDIDA</b>	Candida albicans	clinica, cultura	1-5 di'	Fluconazolo 2 dosi di 1, 3	PERDITE "ricotta"